

PREMIER NIVEAU

Il préconise l'utilisation des antalgiques «dits périphériques » comme les dérivés de l'acide acétylsalicylique, le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens.

NOM COMMERCIAL	LISTE	PRÉSENTATION ET VOIE D'ADMINISTRATION	COMPOSITION	PRISE/24 H MAXIMUM
Dafalgan		Gél. Suppo.	500mg de paracétamol 600mg de paracétamol	6 4
Doliprane		Cp. et sachets suppo	500mg de paracétamol 1 g de paracétamol	6 3
Efféalgan		Cp. effervescents	500mg de paracétamol	6
Géluprane		Gél.	500mg de paracétamol	6
Oralgan		capsules	325mg de paracétamol	6
Salipran		sachets	Bénorilate = 950mg de paracétamol + 1150mg d'aspirine	2
Véganine		Cp.	500mg de paracétamol + 50mg de caféine	6

Le paracétamol doit être utilisé toutes les quatre à six heures à des doses de 500 à 1000 mg par prise sans dépasser 3 g/jour.

L'aspirine a une durée d'action similaire au paracétamol à des doses identiques.

Ces médicaments ont un effet plafond et les effets secondaires de l'aspirine à forte dose et des anti inflammatoires non stéroïdiens limitent leur utilisation au long cours.

SECOND NIVEAU

Il comprend des molécules, qui sont des analgésiques centraux « dits faibles », la codéine et le dextropropoxyphène (Antalvic), souvent associés à du paracétamol dans des préparations commerciales : Codoliprane, Dafalgan codéine, Efferalgan codéine, Lindilane pour la codéine, Di-antalvic et propofan (associé à de la caféine) pour le dextropropoxyphène.

Ce sont des OPIOÏDES FAIBLES

NOM COMMERCIAL	LISTE	PRESENTATION ET VOIE D'ADMINISTRATION	COMPOSITION	PRISE /24 H MAXIMUM
Di-antalvic	I	Cp Suppo.	4mg de paracétamol + 30mg de dextropropoxyphène 80mg de paracétamol + 60mg de dextropropoxyphène	6 2
Propofan	I	Cp.	400mg de paracétamol + 27mg de dextropropoxyphène	6
Dalfagan codéine	I	Cp.	500mg de paracétamol + 30mg de cdéine	6
Codoliprane	I	Cp	400mg de paracétamol + 20mg de codéine	6
Efferalgan codéine	I	Cp. effervescents	500mg de paracétamol	6
Lindilane		Cp.	400md de paracétamol + 25mg de codéine	6
Oralgan codéine	I	Cp.	300mg de paracétamol + 25mg de codéine	6

Salgydal	I	Cp.	250mg de paracétamol +15mg de codéine + 250mg noramydopyrine	6
		Suppo.	500mg de paracétamol + 30mgv de codéine + 500mg noramydopyrine	3
Végadéine	I	Suppo.	500mg de paracétamol +500mgd'aspirine + 15mg de codéine	3
Antalvic	I	Cp.	65mg de dextropropoxyphène	5
Compralgyl	I	Cp.	500mg d'aspirine + 10mg de codéine	4
Dlcodin	I	Cp. Lp	60mg de dihydrocodéine	2
Topalgic	I	Caps.	50mg de tramadol	5
		Amp.inject. IV	100mg de tramadol	4

TROISIÈME NIVEAU

Il est occupé par la morphine.

Ce sont les OPIOÏDES FORTS

NOM COMMERCIAL	LISTE	PRESENTATION ET VOIE D'ADMINISTRATION	COMPOSITION	PRISES/24 H MAXIMUM
AGONISTES PURS : MORPHINE				
Lalamine	II	Gel.	10mg de poudre d'opium = 1mg de morphine + 500mg de paracétamol	6
		Suppo.	15mg d'extrait d'opium = 3mg de morphine + 500mg de paracétamol	3
Morphine	Stup.	Amp. Inject.	10 ou 20mg de morphine	4
Moscontin	Stup.	Cp. LP.	10 – 30 – 60 et 100mg de sulfate de morphine	2
Skénan	Stup.	Cp. LP.	10 – 30 – 60 et 100mg de sulfate de morphine	2
AGONISTES PURS : DÉRIVES DE LA MORPHINE				
Dolosal	Stup.	Amp. Inject.	100mg de péthidine	3
Palfium	Stup.	Amp Inject. Cp.	5mg de dextromoramide	3
AGONISTE PARTIEL				
Temgésic	I	Cp. Sub.ling.	0,2mg de buprénorphine	6
		Amp. Inject.	0,3mg de buprénorphine	3
AGONISTES ANTAGONISTES				

Fortal	Stup.	Amp. IM	30mg de pentazocine	3
Nubain	I	Amp. Inject.	20mg de nalbuphine	6

- aire DGS/DH/DMS n°9984, 11 février 99